

AUA Symptom Score Questionnaire

IPSS - Międzynarodowa skala punktowa objawów towarzyszących chorobom gruczołu krokowego

Poniższy kalkulator złożony jest z 7 pytań, które pomogą ustalić nasilenie objawów spowodowanych przez łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Każda odpowiedź punktowana jest od 0 do 5

Pytania dotyczą ostatniego miesiąca	nigdy	mniej niż 1 na 5 razy	mniej niż połowa	około połowa	więcej niż połowa	prawie zawsze	wynik
Jak często miał Pan uczucie niecałkowitego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>
Jak często musiał Pan oddawać mocz ponownie w czasie krótszym niż dwie godziny po jego poprzednim oddaniu?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>
Jak często zaobserwował Pan przerywany strumień moczu (zacinanie się)?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>
Jak często miał Pan uczucie nagłej konieczności oddania moczu?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>
Jak często obserwował Pan słaby strumień moczu?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>
Jak często musiał Pan wysilać się (przeć), aby rozpocząć oddawanie moczu?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>
Ile razy w ciągu nocy (średnio) musiał Pan wstawać, aby oddać mocz?	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1	<input type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 3	<input type="radio"/> 4	<input type="radio"/> 5	<input type="text"/>

Twój wynik IPSS:

Suma punktów świadczy pośrednio o nasileniu dolegliwości, czyli im większa suma punktów tym dolegliwości są większe. Objawy o niewielkim nasileniu obejmują zakres 0 do 7 punktów, objawy o umiarkowanym nasileniu wahają się od 8 do 19. Suma punktów w granicach 20 do 35 świadczy o znacznym nasileniu objawów.

AUA Symptom Score Questionnaire

0-7 punktów

8-19 punktów

20-35 punktów

objawy łagodne

objawy umiarkowane

objawy znaczne